Vertimec® 1,8%EC

750ml

Producător: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.
Importator: Syngenta Agro SRL, București, Victoria Park, Str. București -Ploiești nr. 73-81, etaj 4, tel.: 021-528.12.00; tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77; tel. urgență: 021-529.25.77;
Substanță activă:18 g/l (1,8 % w/w) abamectin
Denumirile substanțelor periculoase ce trebuie menționate pe etichetă: abamectin
Insecticid / Acaricid
Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 1774/13.02.1997.

SCAPA

approx. measure

500ml

Xn

Nociv

N

Periculos pentru mediu

R22 - NOCIV ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE; R48/22 - NOCIV: PERICOL DE EFECTE GRAVE ASUPRA SĂNĂTĂȚII LA EXPUNERE PRELUNGITĂ PRIN ÎNGHIȚIRE; R50/53 - FOARTE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE PROVOCA EFECTE ADVERSE PE TERMEN LUNG ASUPRA MEDIULUI ACVATIC.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:
DEPOZITAREA: S2 - A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR; **S13** - A SE PĂSTRA DEPARTE DE HRANĂ, BĂUTURI ȘI HRANĂ PENTRU ANIMALE; **PROTECȚIA OPERATORULUI: S20/21** - NU MÂNCAȚI, NU BEȚI ȘI NU FUMAȚI ÎN TIMPUL FOLOSIRII; **PROTECȚIA MEDIULUI: S35** - A NU SE ARUNCA ACEST PRODUS ȘI RECIPIENTUL SĂU DECÂT DUPĂ CE S-AU LUAT TOATE PRECAUȚILE; **S57** - A SE UTILIZA UN AMBALAJ (RECIPIENT) CORESPUNZĂTOR PENTRU EVITAREA ORICĂREI CONTAMINĂRI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR; **SP1** - A NU SE CONTAMINA APA CU PRODUSUL SAU CU AMBALAJUL SĂU; A NU SE CURĂȚA ECHIPAMENTELE DE APLICARE ÎN APROPIEREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ; A SE EVITA CONTAMINAREA PRIN SISTEMELE DE EVACUARE A APELOR DIN FERME SAU DRUMURI. **SPE3** - PENTRU PROTECȚIA ORGANISMELOR ACVATICE RESPECTAȚI O ZONĂ TAMPON NETRATATĂ DE 15 M PÂNĂ LA APA DE SUPRAFAȚĂ; **SPE8** - PERICULOS PENTRU ALBINE! PENTRU A PROTEJA ALBINELE ȘI ALTE INSECTE POLENIZATOARE NU APLICAȚI PE PLANTE ÎN TIMPUL ÎNFLORITULUI! NU UTILIZAȚI PRODUSUL ÎN TIMPUL SEZONULUI ACTIV AL ALBINELOR! ÎNDEPRTAȚI SAU ACOPERIȚI STUPII ÎN TIMPUL APLICĂRII ȘI DUPĂ TRATAMENT! NU APLICAȚI PRODUSUL ÎN PERIOADA DE ÎNFLORIRE A BURUIENILOR! DISTRUGEȚI BURUIENILE ÎNAINTE DE ÎNFLORIRE!

250ml

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR SE VOR RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE.
PENTRU UTILIZARE NUMAI CA INSECTICID ÎN AGRICULTURĂ / HORTICULTURĂ.
Culturl omologate: măr, păr, prun, vinete solarii, castraveți seră și solarii, tomate seră, ardei solarii, gerbera seră și vița de vie.
Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înaintea folosirii produsului.

Vertimec® 1,8%EC

Producător: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.
Importator: Syngenta Agro SRL, București, Victoria Park, Str. București -Ploiești nr. 73-81, etaj 4, tel.: 021-528.12.00; tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77; tel. urgență: 021-529.25.77;
Substanță activă:18 g/l (1,8 % w/w) abamectin
Denumirile substanțelor periculoase ce trebuie menționate pe etichetă: abamectin
Insecticid / Acaricid
Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 1774/13.02.1997.

SCAPA

Xn

Nociv

N

Periculos pentru mediu

R22 - NOCIV ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE; R48/22 - NOCIV: PERICOL DE EFECTE GRAVE ASUPRA SĂNĂTĂȚII LA EXPUNERE PRELUNGITĂ PRIN ÎNGHIȚIRE; R50/53 - FOARTE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE PROVOCA EFECTE ADVERSE PE TERMEN LUNG ASUPRA MEDIULUI ACVATIC.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:
DEPOZITAREA: S2 - A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR; **S13** - A SE PĂSTRA DEPARTE DE HRANĂ, BĂUTURI ȘI HRANĂ PENTRU ANIMALE; **PROTECȚIA OPERATORULUI: S20/21** - NU MÂNCAȚI, NU BEȚI ȘI NU FUMAȚI ÎN TIMPUL FOLOSIRII; **PROTECȚIA MEDIULUI: S35** - A NU SE ARUNCA ACEST PRODUS ȘI RECIPIENTUL SĂU DECÂT DUPĂ CE S-AU LUAT TOATE PRECAUȚILE; **S57** - A SE UTILIZA UN AMBALAJ (RECIPIENT) CORESPUNZĂTOR PENTRU EVITAREA ORICĂREI CONTAMINĂRI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR; **SP1** - A NU SE CONTAMINA APA CU PRODUSUL SAU CU AMBALAJUL SĂU; A NU SE CURĂȚA ECHIPAMENTELE DE APLICARE ÎN APROPIEREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ; A SE EVITA CONTAMINAREA PRIN SISTEMELE DE EVACUARE A APELOR DIN FERME SAU DRUMURI. **SPE3** - PENTRU PROTECȚIA ORGANISMELOR ACVATICE RESPECTAȚI O ZONĂ TAMPON NETRATATĂ DE 15 M PÂNĂ LA APA DE SUPRAFAȚĂ; **SPE8** - PERICULOS PENTRU ALBINE! PENTRU A PROTEJA ALBINELE ȘI ALTE INSECTE POLENIZATOARE NU APLICAȚI PE PLANTE ÎN TIMPUL ÎNFLORITULUI! NU UTILIZAȚI PRODUSUL ÎN TIMPUL SEZONULUI ACTIV AL ALBINELOR! ÎNDEPRTAȚI SAU ACOPERIȚI STUPII ÎN TIMPUL APLICĂRII ȘI DUPĂ TRATAMENT! NU APLICAȚI PRODUSUL ÎN PERIOADA DE ÎNFLORIRE A BURUIENILOR! DISTRUGEȚI BURUIENILE ÎNAINTE DE ÎNFLORIRE!

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR SE VOR RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE.
PENTRU UTILIZARE NUMAI CA INSECTICID ÎN AGRICULTURĂ / HORTICULTURĂ.
Culturl omologate: măr, păr, prun, vinete solarii, castraveți seră și solarii, tomate seră, ardei solarii, gerbera seră și vița de vie.
Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înaintea folosirii produsului.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Proprietăți fizico-chimice: Vertimec 1,8% EC este un acaricid/insecticid formulat sub formă de concentrat emulsionabil și se prezintă sub formă de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galben-pai.
Conține 18 g/l abamectin.

Mod de acțiune:
VERTIMEC 1,8 EC conține abamectin care acționează ca agonist al GABA (Acid Gamma Amino Butiric) care stimulează eliberarea acestuia din membranele inhibitoare pre-sinaptice la nivelul terminațiilor nervoase și care potențează legarea GABA de receptorii specifici din celulele musculare ale artropodelor. După legarea GABA de receptorii specifici rezultă un flux crescut al ionilor de clor în celulă, care blochează semnalele nervoase.
VERTIMEC pătrunde rapid în plantă, unde formează un depozit activ de produs ce asigură controlul dăunătorilor pe o perioadă lungă de timp. Produsul este sistemic local (translaminar/penetrant) în frunze și lăstari cruzi (erbacei sau verzi). Datorită pătrunderii în frunze protejează și suprafața netratată a acestora (fața inferioară) unde se instalează și se hrănesc majoritatea dăunătorilor și în special acarieni.
VERTIMEC 1,8 EC acționează asupra dăunătorilor, în principal prin ingestie, distrugând adulții și larvele care se hrănesc cu părțile tratate ale plantei. VERTIMEC 1,8 EC are și activitate parțială prin contact (dacă în momentul aplicării dăunătorull este atins de soluția de stropit). După tratamentul cu VERTIMEC 1,8 EC, dăunătorii paralizează imediat, hrănirea este oprită fără a produce pagube, însă maximul de mortalitate se obține în 4-5 zile de la ingerarea dozei letale.

Combaterea integrată (IPM):
VERTIMEC 1,8 EC poate fi folosit în programele de combatere integrată a dăunătorilor. În cazul în care în sere se folosesc insecte polenizatoare (bondari) acestea trebuie ținute închise în stup în timpul tratamentului și 24 de ore după tratamentul cu VERTIMEC 1,8 EC.

Managementul prevenirii aparitiei formelor rezistente:
Pentru prevenirea dezvoltării de forme rezistente se recomandă a nu se depăși numărul maxim de aplicări pe sezon recomandat de 4-5 la legume, 2 la pomi și vie. Alternarea se face cu produse din alte grupe chimice, în afară de avermectine (abamectin și milbemectin).
Nu se recomandă utilizarea a mai mult de 2-3 tratamente consecutive în bloc.

Bune practici de utilizare:
Aplicarea tratamentelor se recomandă a se executa dimineața sau seara când temperatura este moderată (< 25°C) sau scăzută, fiind astfel favorizate absorbția și penetrarea în plantă crescând calitatea, eficacitatea și durata de protecție a tratamentului.
Pentru a îmbunătăți penetrarea în plantă, durata de protecție, uniformitatea tratamentului și rezultatele obținute se recomandă utilizarea în amestec cu adjuvanți autorizați care conțin ulei mineral sau vegetal în doză de 0,25% (250 ml/100 l apă) sau cu adjuvanti organosiliconici penetranți.
Volumul de apă recomandat se adaptează în funcție de stadiul de dezvoltare al culturii, volumul masei foliare și de tipul de cultură, respectând doza pe ha de produs comercial.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

În România produsul este omologat pentru:

Cultura	Dăunător	Doza	Timp de pauză până la recoltare
Măr	Panonychus ulmi (acarianul roșu al pomilor) Tetranychus sp. (acarianul comun) Aculus schtechtendali (acarianul filocoptid al mărului) Leucoptera scitella (insecte minatoare) Phyllonorycter blancardella (insecte minatoare)	0,1% (1,5 l/ha) 1-1,5 l/ha în funcție de nivelul de infenstare	28 zile
Păr	Psylla pyri (puricele melifer al părului)	1-1,5 l/ha 0,1%-0,15% în funcție denivelul de infenstare	28 zile
Prun	Panonychus ulmi (acarianul roșu al pomilor) Tetranychus sp. (acarianul comun) Aculus fokeui (acarianul filocoptid al puieților de prun)	 1-1,5 l/ha 0,1%-0,15% în funcție de nivelul de infenstare	 28 zile
Vinete solarii	Tetranychus sp. (acarianul comun) Polyphagotarsonemus latus (acarianul lat)	0,1 % (1 l/ha)	 3 zile
Castraveți seră	Tetranychus urticae (acarianul roșu comun)	0,08%	3 zile
Castraveți solarii	Tetranychus sp. (acarianul comun)	0,1 % (1 l/ha)	3 zile
Tomate seră	Liriomyza trifolii (musca minieră)	0,08%	3 zile
Ardei solarii	Polyphagotarsonemus latus (acarianul lat)	0,1 % (1 l/ha)	3 zile
Gerbera seră	Liriomyza trifolii (musca minieră)	0,08%	-
Vița de vie	Tetranychus urticae (acarianul viței de vie) Eriophyes vitis (păianjenul galicol al viței de vie)	0,8-1,0 l/ha în 1000 l apă (dozele se folosesc diferențiat în funcție de presiunea de infestare)	28 zile

Pentru informații referitoare la utilizarea produsului și tehnica de aplicare, sunați la numărul de telefon:
021-528.12.77, de luni până vineri între orele: 08:00-18:00.

Momentul aplicării:
Vinete și ardei: se aplică la apariția primilor dăunatori și se repetă tratamentul la un interval minim de 7 zile dacă atacul dăunătorilor este foarte puternic. Nu se aplică cu 3 zile înainte de recoltare.
Castraveți: se aplică la apariția primilor dăunatori și se repetă tratamentul la un interval minim de 7 zile dacă atacul dăunătorilor este foarte puternic, de la apariția primei frunze adevărată și până la deschiderea primei flori. Nu se aplică cu 3 zile înainte de recoltare.
Dacă sunt prezente albine, bondari sau alte insecte polenizatoare nu se utilizează Vertimec pe durata înfloritului.

Viță de vie: Pentru Eriophyes vitis se aplică preventiv, înainte de apariția simptomelor, de când se desface/degajă cea de-a 3 frunză adevărată de pe lăstarul de 1,5 - 2 cm în faza de rozetă.
Pentru Tetranichus urticae tratamentul se aplică la apariția primilor dăunători, avertizare sau când se înregistrează PED de 3-5 adulți pe frunză. Vertimec se poate utiliza fenologic de la dezmugurit și până la compactare fără a se aplica pe durata înfloritului.
Prun: Tratamentul cheie în combaterea de succes a acarienilor este aplicarea tratamentului în primele 10-14 zile după scuturarea petalelor în funcție de condițiile climatice.
Măr și Păr:
- Insecte minatoare: se aplică preventiv, după scuturatul petalelor, când se înregistrează Pragul Economic de Dăunătorilor (PED), depunerea pontei sau penetrarea incipientă în plantă, până când galeria atinge 2-3 mm in diametru.
- Acarieni se recomandă: aplicarea tratamentului în primele 10-14 zile după scuturarea petalelor, moment optim pentru combaterea acestora în funcție de condițiile climatice.
- Psylla: primul tratament se aplică în primele 2 săptămâni după scuturatul petalelor, urmat de al 2-lea tratament la 14 zile.
Se va aplica împreună cu un ulei mineral sau adjuvant organosiliconic penetrant.
Tomate: se aplică la apariția primilor dăunători și se repetă tratamentul la un interval minim de 7 zile dacă atacul dăunătorilor este foarte puternic, de la apariția primei frunze adevărată și până la recoltare.
Musculița minieră - tratamentele se efectuează preventiv, la apariția primilor adulți - depunerea ouălor. Nu se aplică cu 3 zile înainte de recoltare.

Tehnica de aplicare:
Toate echipamentele vor fi calibrate corespunzător înainte de folosire. Volumul de apă va fi specific fiecărei culturi în vederea unei bune acoperiri a întregului foliaj dar se va evita șiroirea. Se va opri stropirea dacă vântul bate cu mai mult de 5 m/s. Nu se va stropi în timpul orelor cu temperaturi ridicate din timpul zilei sau dacă ploaia este iminentă.

Pregătirea amestecului:
Se va verifica ca echipamentul de stropit să fie curat și necontaminat. Se va calcula cu atenție cantitatea necesară de soluție de stropit, astfel încât să nu rămână soluție în rezervor după efectuarea tratamentului.
Modul de lucru: se va adăuga 1/4 - 1/2 din cantitatea necesară de apă, se pornește sistemul de agitare, se adaugă cantitatea măsurată de Vertimec 1,8% EC. Se va adăuga apoi restul de apă. Se va menține agitatorul în funcțiune pe toată durata aplicării. Nu se va lăsa soluția de stropit în rezervorul echipamentului pentru o perioadă lungă de timp (în timpul pauzelor de masă sau peste noapte).
Compatibilitate: În mod obișnuit, Vertimec 1,8% EC nu se amestecă cu alte pesticide.
Curățarea echipamentului de stropit: După aplicare sau la sfârșitul zilei se va curăța bine echipamentul de stropit cu apă curată.

Măsuri de igiena și protecția muncii:
A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor și a altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor.
A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora.
Echipamentul de lucru va cuprinde: Pentru pregătirea soluției: mănuși impermeabile, încălțăminte solidă, combinezon și echipament pentru protecția feței și ochilor; la aplicare: combinezon, căciulă, încălțăminte solidă, echipament pentru protecția feței și ochilor,

mănuși impermeabile. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fără a se freca.
Primul ajutor: Aveți cu dumneavoastră ambalajul, eticheta sau fișa de siguranță a produsului când sunați la telefonul de urgență Syngenta, la un spital sau doctor sau când mergeți pentru tratament.
În caz de contact cu ochii: Se vor spăla imediat cu jet ușor de apă timp de minimum 15 minute ținând ochii deschiși. Se va consulta imediat un medic.
În caz de contact cu pielea: Se vor îndepărta imediat hainele contaminate. Se va spăla imediat pielea cu apă. Se va consulta medicul dacă iritația persistă. Hainele contaminate se vor spăla înainte de refolosire.
În caz de inhalare: Mutați persoana din mediul toxic la aer curat. În caz că respirația este oprită sau neregulată se va asigura respirație artificială. I se va menține temperatura normală și se va feri de efort. Se va apela imediat la medic sau la serviciile medicale.
În caz de ingestie: Apelați imediat la ajutor medical și arătați eticheta, bidonul sau fișa de siguranță a produsului. Nu se va provoca voma.
Simptome: dilatarea pupilelor; lipsa coordonărilor; tremurat.
Sfat medical: Acest produs se crede ca intensifică activitatea GABA la animale. Este bine a se evita administrarea medicamentelor care pot intensifica activitatea GABA (barbituricele, bezodiazifinele, acidul valproic) la pacienții care prezintă expunere potențial toxică la abamectin. Toxicitatea poate fi redusă prin administrarea timpurie a absorbanților chimici (cărbune activ). Dacă toxicitatea din momentul expunerii cauzează voma severă, trebuie evaluată exact pierderea de lichide și dezechilibrul electrolitic rezultat. Trebuie urmată terapia de înlocuire a lichidelor pierdute și totodată, trebuie luate celelalte măsuri indicate de simptomatologia clinică.
Antidot: Nu se cunoaște un antidot specific. Se va aplica tratament simptomatic. Nu se va folosi lapte ca antidot.
A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor și în zonele de acces a animalelor.

Măsuri pentru protecția mediului:
Deoarece produsul este foarte toxic față de organismele acvatice, în tehnologiile și în instrucțiunile de utilizare a produsului vor fi înscrise măsurile obligatorii de respectat pentru protecția apelor, în conformitate cu dispozițiile legale.
Nu se aplică pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă. Să se prevină prin orice mijloace ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Pentru evitarea contaminării apelor produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Nu se vor contamina lacurile, canalele de irigație, râurile sau orice acumulare de apă. Se impune respectarea măsurilor de protecție față de albine, având în vedere toxicitatea substanței active față de aceste organisme. Se vor atenționa organele locale pentru avertizarea crescătorilor de albine, în perioadele de aplicare ale produsului. Nu se aplică pe culturile în floare precum și atunci când buruienile sunt înflorite.

Măsuri în caz de deversări accidentale:
În cazul unei deversări accidentale, produsul se colectează, utilizând material absorbant, necombustibil (nisip, pământ, diatomită etc.) și se transferă într-un container special până la distrugere/neutralizare conform dispozițiilor legale în vigoare.
Dacă produsul contaminează râurile sau lacurile se vor informa imediat autoritățile.

Eliminarea ambalajelor goale:
După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.872.272 număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA.

Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri. Condiții de depozitare și transport: Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, departe de alimente și furaje, fără acțiunea directă a razelor solare și a căldurii.
Transportul se efectueaza ferit de intemperii și caldură. Pe timpul manipulării transportului, se iau obligatoriu toate măsurile de protecția muncii, PSI etc. Temperatura de depozitare între -10ºC și +35ºC. Se va feri de surse de căldură.

Condiții de depozitare și transport:
Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate destinate în exclusivitate pentru pesticide, fără acțiunea directă a razelor de soare și umezeală, separat de alimente și furaje. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și al depozitării se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI etc. Temperatura de depozitare între -10°C și +35°C.

Măsuri de prevenirea și stingerea incendiilor:
Se vor lua măsurile specifice de prevenire și stingerea incendiilor provocate prin aprinderea pesticidelor. În caz de incendiu se va folosi ca agent se stingere: pentru incendii mici se va folosi spray de apă (nu se va folosi jet direct de apă), pudră, spumă sau CO_2; pentru incendii mari se va folosi spumă alcool rezistentă sau spray de apă. Se vor lua măsuri de prevenirea contaminării apelor de suprafață și solului cu agentul folosit la stingerea incediului. Întrucât produsul conține compuși organici combustibili, prin ardere va forma un fum dens negru, iritant și toxic. În cazul intervenției pentru stingerea unui incendiu se va folosi echipament complet de protecție și aparat autonom de respirat.

Termen de valabilitate: Produsul este valabil 3 ani de la data fabricației, în condițiile de depozitare menționate mai sus.

În atenția utilizatorului:
Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi folosit în scopul propus. Garantăm calitatea produsului, dar nu ne asumăm riscurile pentru eventualele daune provocate de incorecta manipulare, depozitare sau utilizare a acestuia. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizarii neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru evitarea apariției organismelor rezistente la acțiunea produselor fitosanitare este indicată alternarea grupelor chimice ale produselor. Producătorul recomandă utilizarea unor tehnologii integrate de combatere care să prevină apariția organismele rezistente.
Orice nerespectare a indicațiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității sau la un eșec total.
Relații suplimentare se pot obține de la Unitățile Fitosanitare Județene sau Syngenta Agro SRL, București,
tel.: +(40 21) 528 12 00.

® marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta
© 2012 Syngenta Crop Protection AG

În caz de urgență contactați: Syngenta Agro SRL, București
Serviciul de urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Anglia:
Tel.: +44 1484 538 444; Fax: +44 1484 554 093
Centrul de informare toxicologică, Institutul de Sănătate Publică, București, Tel.: +40 21 318 36 06; +40 21 318 36 20, interior 235