

de apă. Să se prevină prin orice mijloace ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Nu se vor contamina râurile, heleșteele, lacurile, apa de irigație sau alte acumulări de apă.

Măsuri în caz de deversări accidentale:

În cazul unei împrăstieri accidentale produsul se colectează cu ajutorul unor materiale absorbante neinflamabile (nisip, pământ, diatomit, vermiculit, etc.) și se transferă într-un container special pentru a fi neutralizat conform dispozițiilor legale în vigoare. Dacă produsul contaminează râuri sau lacuri se vor informa imediat autoritățile.

Eliminarea ambalajelor goale:

După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA.

Telefonați la 0800.872.272 număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:

Se vor lua măsurile specifice de prevenirea și stingerea incendiilor provocate prin inflamarea pesticidelor. Ambalajele expuse la foc se vor menține reci prin stropire cu apă. Pentru incendii mici se va folosi ca agent de stingere: spumă, dioxid de carbon sau pudră. Pentru incendii mari se va folosi spumă sau ceață de apă; evitați folosirea jeturilor de apă. Se vor lua măsuri de prevenire a contaminării apelor sau solului cu agentul folosit la stingerea incendiului. Deoarece produsul conține componente organice

inflamabile, focul va produce un fum negru și dens ce conține substanțe periculoase pentru sănătate. A se purta echipament specific și aparat de respirat autonom.

Condiții de depozitare și transport: produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pesticidelor, fără acțiunea directă a razelor solare și a căldurii. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua toate măsurile de protecția muncii și P.S.I. Temperatura de depozitare între 0°C și +30°C.

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației, în condițiile de depozitare menționate mai sus.

În atenția utilizatorului: Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi folosit în scopul propus. Garantăm calitatea produsului, dar nu ne asumăm riscurile pentru eventualele daune provocate de incorecta manipulare, depozitare sau utilizare a acestuia. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru evitarea apariției organismelor rezistente la acțiunea produselor fitosanitare este indicată alternarea grupelor chimice ale produselor. Producătorul recomandă utilizarea unor tehnologii integrate de combatere care să prevină apariția organismele rezistente. Orice nerespectare a indicațiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității sau la un eșec total.

Relații suplimentare se pot obține de la Unitățile Fitosanitare Județene sau la Syngenta Agro SRL, București, tel.: +(40 21) 528 12 00.

® marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta
© 2011 Syngenta Crop Protection AG

În caz de urgență contactați: Syngenta Agro SRL, București Serviciul de urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Anglia: Tel.: +44 1484 538 444; Fax: +44 1484 554 093

Centrul de informare toxicologică, Institutul de Sănătate Publică, București, Tel.: +40 21 318 36 06; +40 21 318 36 20, interior 235



Deținătorul omologării: Syngenta Limited, Anglia.
Producător: Syngenta Limited, Anglia.
Importator: Syngenta Agro SRL, Victoria Park, Str. București-Ploiești nr. 73-81, etaj 4, tel. 021-528.12.00; tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77; tel. urgență: 021-529.25.77
Substanță activă: 150 g/l (15,8% w/w) fluazifop-p-butil
Denumirile substanțelor periculoase ce trebuie menționate pe etichetă: fluazifop - p - butil
Erbicid
Formulare: concentrat emulsionabil
Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 2019 / 26.10.1999
Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației, păstrat în ambalaje originale închise etanș.
Depozitare: Se va păstra la adăpost de căldură și umezeală. Se va feri de îngheț.

Xn



Nociv

R38 - IRIȚANT PENTRU PIELE; R43 - POATE PROVOCA SENSIBILIZARE ÎN CONTACT CU PIELEA; R50/53 - FOARTE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE PROVOCA EFECTE ADVERSE PE TERMEN LUNG ASUPRA MEDIULUI ACVATIC; R63 - RISC POSIBIL DE A DĂUNA COPILULUI ÎN TIMPUL SARCINII.

N



Periculos pentru mediu

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:
DEPOZITAREA: S2 - A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR; S13 - A SE PĂSTRA DEPARTE DE HRANĂ, BĂUTURI ȘI HRANĂ PENTRU ANIMALE;
PROTECȚIA OPERATORULUI: S20/21 - NU MÂNCĂȚI, NU BEȚI ȘI NU FUMAȚI ÎN TIMPUL FOLOSIRII; S36/37 - PURTAȚI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE ȘI MÂNUȘI CORESPUNZĂTOARE;
PROTECȚIA MEDIULUI: S35 - A NU SE ARUNCA ACEST PRODUS ȘI RECIPIENTUL SĂU DECÂT DUPĂ CE S-AU LUAT TOATE PRECAUȚIILE; S57 - A SE UTILIZA UN AMBALAJ (RECIPIENT) CORESPUNZĂTOR PENTRU EVITAREA ORICĂREI CONTAMINĂRI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR; SP1 - A NU SE CONTAMINA APA CU PRODUSUL SAU CU AMBALAJUL SĂU; A NU SE CURĂȚA ECHIPAMENTELE DE APLICARE ÎN APROPIEREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ;
SPE3 - PENTRU PROTECȚIA ORGANISMELOR ACVATICE RESPECTAȚI O ZONĂ TAMPON NETRATĂ DE 15M PÂNĂ LA APA DE SUPRAFAȚĂ.

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR SE VOR RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE. PENTRU UTILIZARE NUMAI CA ERBICID ÎN AGRICULTURĂ / HORTICULTURĂ.
Culturile omologate: floarea soarelui, cartof, sfecla de zahăr, soia, rapiță, tomate, castraveți, varză, pepeni, ardei, ceapă, măr pe rod, plantații viticole, arbuști fructiferi (coacăz, afin, mur și zmeur), căpșuni și pepiniere pomicole. Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înainte de folosirea produsului.

Numele produselor marcate cu ® sau ™, sigla SYNGENTA, și elementele alăturate sunt mărci ale unor companii din grupul Syngenta

5 Litri e

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Proprietăți fizico-chimice: Fusilade Forte este un concentrat emulsionabil, lichid limpede, omogen, mobil, de culoare brună.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

În România produsul este omologat la:

Cultura	Buruieni	Doza
Floarea-soarelui	monocotiledonate anuale:	0,8 l/ha
	Setaria, Echinochloa,	postemergent
	Digitaria, Sorghum din semințe	
	Costreiul (Sorghum) din rizomi:	
	- când plantele de costrei	1,0 l/ha
	au înălțimea mai mică de 15 cm	
	- când plantele de costrei	1,3 l/ha
	au înălțimea între 15-25 cm	
Cartof	monocotiledonate anuale:	0,8-1,0 l/ha
	Setaria glauca, Setaria viridis,	postemergent
	Echinochloa cruss-galli	
	monocotiledonate anuale:	1,0 l/ha
	Digitaria sanguinalis, Avena fatua	postemergent
	monocotiledonate perene:	1,3 l/ha
	- Agropyron repens < 10-15 cm,	postemergent
	Sorghum halepense < 20-25 cm	
	monocotiledonate perene:	1,5 l/ha
	- Agropyron repens < 25 cm,	postemergent
	Sorghum halepense < 25-35 cm	
Sfeclă de zahăr	monocotiledonate anuale	0,8 l/ha
	până la faza de înfrățire	postemergent
	monocotiledonate perene	1,0-1,3 l/ha
	până la 15 cm înălțime	postemergent
Soia	monocotiledonate anuale:	0,8 l/ha
	Setaria, Echinochloa,	psostemergent

Cultura	Buruieni	Doza
	Costreiul (Sorghum) din rizomi:	
	- când plantele de costrei	1,0 l/ha
	au înălțimea mai mică de 15 cm	postemergent
	- când plantele de costrei	1,3-1,5 l/ha
	au înălțimea între 15-25 cm	
Rapiță	monocotiledonate anuale (2-4 frunze):	0,8 l/ha
	Setaria, Echinochloa, Sorghum din semințe	postemergent
	Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi	1 l/ha
	la faza optimă 15-20 cm	postemergent
Tomate transplantate	monocotiledonate anuale	0,8 l/ha
		postemergent
	monocotiledonate perene	1,3 l/ha
		postemergent
Tomate semănate direct în câmp,	monocotiledonate anuale	0,8 l/ha
	castraveți de câmp	
	varză de vară de câmp,	1,0 l/ha
	pepeni verzi câmp,	
	ardei gras de câmp,	
	ceapă semănată direct în câmp	
Măr pe rod	monocotiledonate anuale și	1,0 l/ha
	perene cu înălțimea < 15 cm	
	monocotiledonate anuale și	1,3 l/ha
	perene cu înălțimea între 15-25 cm	(în 300 l apă/ha)
Plantații viticole	monocotiledonate anuale	1,3 l/ha
		postemergent
Arbuști fructiferi (coacăz, afin, mur, zmeur)	monocotiledonate anuale	1 l/ha
		(300 l apă/ha)
	Căpșun și pepiniere	1,3 l/ha
	pomicole C I și C II	(300 l apă/ha)

Pentru informații referitoare la utilizarea produsului și tehnica de aplicare, sunați la numărul de telefon: 021-528.12.77, de luni până vineri între orele: 08:00-18:00.

Timp de pauză:

56 zile cartof, 28 zile la vița de vie, măr și pepiniere pomicole, 30 zile la castraveți, ceapă și tomate, 35 zile la ardei gras, 42 zile la pepeni și varză.

Spectru de combatere:

Fusilade Forte controlează buruienile monocotiledonate anuale și perene, inclusiv Sorghum halepense (costreiul) din rizomi, răsărite la momentul aplicării.

Recomandări de aplicare:

Produsul se aplică prin stropiri în timpul vegetației, postemergent, atunci când buruienile sunt răsărite și în stadiul de creștere activă. Momentul optim de aplicare este: de la 2 frunze până la înfrățire pentru buruienile anuale și peste 4 frunze până la înălțimea de 20-25 cm pentru buruienile perene. Doza se ajustează în funcție de gradul de infestare și înălțimea buruienilor, conform omologărilor. La ceapă se aplică după formarea de 2-3 frunze adevărate sau după efectuarea testului cu cristal violet, pentru a verifica existența stratului de pruină/ ceară pe suprafața plantelor. Dacă înainte de tratament plouă, se așteaptă 48-72 de ore până la efectuarea tratamentului, pentru formarea pruinei pe plante.

Compatibilitate:

Produsul poate fi amestecat cu alte produse de uz fito-sanitar. Înainte de folosire consultați tabelele de compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă.

Măsuri de igienă și protecția muncii:

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se manancă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a se freca.

Primul ajutor:

Recomandare: Să aveți la dvs. ambalajul, eticheta sau fișa de siguranță atunci când sunați la numărul de urgență Syngenta sau la medic, sau când mergeți pentru tratament.

În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată și se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apălați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de contact cu ochii: aceștia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. Apelați imediat la medic.

În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită se va asigura respirația artificială. Țineți pacientul la căldură și fără efort. Sunați imediat la medic.

În caz de înghițire: se va apela imediat la medic unde se va arăta această etichetă sau ambalajul produsului. A nu se provoca voma. **Sfat medical:** Nu există antidot specific disponibil; se va efectua un tratament simptomatic.

Măsuri de protecția mediului:

Deoarece produsul este foarte toxic pentru organismele acvatice și alge, în tehnologiile și instrucțiunile de utilizare se vor înscrie măsurile obligatorii de respectat pentru protecția apelor conform prevederilor legale. Nu se aplică pe terenurile adiacente cursurilor